

# FÍSICA TEÓRICA 2

## SEGUNDO CUATRIMESTRE 2005

### PRÁCTICA 5: SIMETRÍAS

1. Calcule los tres niveles de energía mas bajos, junto con sus degeneraciones, para los siguientes sistemas (suponga que se trata de partículas distinguibles de igual masa):
  - a) Tres partículas no interactuantes de espín 1/2 en una caja de longitud  $L$ .
  - b) Cuatro partículas no interactuantes de espín 1/2 en una caja de longitud  $L$ .
2. Sea  $\mathcal{T}_{\mathbf{d}}$  el operador de traslación con vector desplazamiento  $\mathbf{d}$ ,  $\mathcal{D}(\hat{\mathbf{n}}, \phi)$  el operador de rotación ( $\hat{\mathbf{n}}$  y  $\phi$  son respectivamente el eje y el ángulo de rotación) y  $\Pi$  el operador de paridad. ¿Cuáles de los siguientes pares de operadores conmutan? ¿Por qué?
  - a)  $\mathcal{T}_{\mathbf{d}}$  y  $\mathcal{T}_{\mathbf{d}'}$  ( $\mathbf{d}$  y  $\mathbf{d}'$  en distintas direcciones).
  - b)  $\mathcal{D}(\hat{\mathbf{n}}, \phi)$  y  $\mathcal{D}(\hat{\mathbf{n}}', \phi')$  ( $\hat{\mathbf{n}}$  y  $\hat{\mathbf{n}}'$  en distintas direcciones).
  - c)  $\mathcal{T}_{\mathbf{d}}$  y  $\Pi$ .
  - d)  $\mathcal{D}(\hat{\mathbf{n}}, \phi)$  y  $\Pi$ .
3. Se sabe que un estado cuántico  $|\Phi\rangle$  es simultáneamente autoestado de dos operadores hermíticos  $A$  y  $B$  que anticonmutan. ¿Qué puede decir sobre los correspondientes autovalores de  $A$  y  $B$  para este estado? Ilustre el resultado usando el operador paridad y el operador de momentos (utilice que  $\Pi = \Pi^{-1} = \Pi^\dagger$ ).
4. Una partícula de espín 1/2 está ligada a un centro fijo por un potencial esféricamente simétrico. Considere las funciones espín-angulares

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}_l^{j=l\pm 1/2, m} &= \pm \sqrt{\frac{l \pm m + 1/2}{2l + 1}} Y_l^{m-1/2}(\theta, \phi) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \sqrt{\frac{l \mp m + 1/2}{2l + 1}} Y_l^{m+1/2}(\theta, \phi) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2l + 1}} \begin{pmatrix} \pm \sqrt{l \pm m + 1/2} Y_l^{m-1/2}(\theta, \phi) \\ \sqrt{l \mp m + 1/2} Y_l^{m+1/2}(\theta, \phi) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

que son autofunciones de  $L^2$ ,  $S^2$ ,  $J^2$ , y  $J_z$  simultáneamente.

- a) Escriba la función espín-angular  $\mathcal{Y}_{l=0}^{j=1/2, m=1/2}$ .
- b) Expresé  $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{x}) \mathcal{Y}_{l=0}^{j=1/2, m=1/2}$  en términos de  $\mathcal{Y}_l^{j, m}$ .

c) Muestre que el resultado obtenido en (b) se puede interpretar usando las propiedades de transformación de  $\mathbf{S} \cdot \mathbf{x}$  ante rotaciones e inversión espacial (paridad).

5. Debido a interacciones débiles existentes entre los electrones atómicos y el núcleo, se puede tomar un potencial que viola paridad de la siguiente forma:

$$V = \lambda \left[ \delta^3(\mathbf{x}) \mathbf{S} \cdot \mathbf{p} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{p} \delta^3(\mathbf{x}) \right]$$

donde  $\mathbf{S}$  y  $\mathbf{p}$  son los operadores de espín y de momento del electrón respectivamente, y se supone que el núcleo está ubicado en el origen de coordenadas. Como resultado, el estado fundamental de un átomo alcalino, usualmente caracterizado por  $|n, l, j, m\rangle$ , en realidad contiene pequeñas contribuciones provenientes de otros autoestados en la siguiente manera:

$$|n, l, j, m\rangle \rightarrow |n, l, j, m\rangle + \sum_{n'l'j'm'} C_{n'l'j'm'} |n', l', j', m'\rangle.$$

Usando solamente consideraciones de simetría, ¿qué puede decir acerca de los  $(n', l', j', m')$  que dan contribuciones no nulas? Suponga que las funciones de onda radiales y los niveles de energía son conocidos. Indique como calcularía los  $C_{n'l'j'm'}$ . ¿Se obtienen más restricciones acerca de los  $(n', l', j', m')$ ?

6. a) Sea  $\phi(x, t)$  la función de onda de una partícula sin espín correspondiente a una onda plana en tres dimensiones. Muestre que  $\phi^*(x, -t)$  es la función de onda de una onda plana con la dirección del momento invertida .

b) Sea  $\chi(\hat{\mathbf{n}})$  el auto-espínor de dos componentes de  $\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}$  con autovalor +1. Utilizando la forma explícita de  $\chi(\hat{\mathbf{n}})$  en términos de los ángulos polares y azimutales  $\alpha$  y  $\beta$  que caracterizan a  $\hat{\mathbf{n}}$ , verifique que  $-i\sigma_y \chi^*(\hat{\mathbf{n}})$  es el auto-espínor con la dirección de espín invertida.

7. a) Asumiendo que el hamiltoniano es invariante ante inversión temporal, pruebe que la función de onda para un sistema no degenerado sin espín, puede ser elegida real en cada instante de tiempo.

b) La función de onda para un estado de onda plana está dada en  $t = 0$  por la función compleja  $e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}$ . ¿Por qué esto no viola la invariancia de inversión temporal?

8. Sea  $\phi(\mathbf{p}') = \langle \mathbf{p}' | \alpha \rangle$  la función de onda en representación de momentos del estado  $|\alpha\rangle$ . La función de onda en representación de momentos del estado  $\Theta|\alpha\rangle$  (donde  $\Theta$  es el operador de inversión temporal), ¿está dada por  $\phi(\mathbf{p}')$ ,  $\phi(-\mathbf{p}')$ ,  $\phi^*(\mathbf{p}')$  ó por  $\phi^*(-\mathbf{p}')$ ? Justifique.

9. a) ¿Cuál es el estado inverso-temporal correspondiente a  $\mathcal{D}(R)|j, m\rangle$ ?

b) Usando las propiedades de inversión temporal y rotaciones, pruebe que

$$\mathcal{D}_{m',m}^{(j)*}(R) = (-1)^{m-m'} \mathcal{D}_{-m',-m}^{(j)}(R)$$

c) Pruebe que  $\Theta|j, m\rangle = i^{2m}|j, -m\rangle$ .

10. Suponga que una partícula sin espín está ligada a un centro fijo por un potencial  $V(\mathbf{x})$ , tan asimétrico que ningún nivel de energía es degenerado. Usando invariancia ante inversión temporal, pruebe que

$$\langle \mathbf{L} \rangle = 0$$

para cualquier autoestado de energía. Si la función de onda de uno de estos autoestados no degenerados se expande en la forma

$$\sum_l \sum_m F_{lm}(r) Y_l^m(\theta, \phi)$$

¿qué tipo de restricciones de fase se obtienen para  $F_{lm}(r)$ ?

11. El hamiltoniano de un sistema de espín 1 está dado por

$$H = AS_z^2 + B(S_x^2 - S_y^2)$$

Resuelva exactamente este problema para encontrar los autoestados normalizados de energía y sus autovalores (un hamiltoniano dependiente del espín de este tipo aparece en el estudio de cristales). ¿Es este hamiltoniano invariante ante inversión temporal? ¿Cómo se transforman ante inversión temporal los autoestados normalizados obtenidos?